Г. К. ДЗЮБ¹, В. А. ПРОЦИК²**ПСИХОДИАГНОСТИКА СУИЦИДА**¹Киевский национальный университет им. Т. Шевченко²Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца <grigori_dzub@gmx.net>

Предложена оригинальная гипотеза обнаружения готовности к самоубийству: диссоциация между низкой самооценкой и высоким уровнем притязаний имеет место при всех видах суицида. Главным положением является то, что суицид совершается в ситуации, когда окружающие условия являются или представляются полностью несовместимыми с самооценкой человека, сохранением личности, тогда защитная приспособительная реакция личности совершается самым радикальным способом – самоуничтожением. Поэтому для обнаружения готовности к самоубийству можно использовать методы экспериментально-психологического (психодиагностического) исследования. Это методы самооценки ситуации, т. е. тест оценки собственных достоинств, а также определения уровня притязаний в поведении. Расхождение показателей этих тестов будет отражать степень готовности к суициду. Путём клинического и экспериментально-психологического исследований получено подтверждение. На материале 240 испытуемых использовали модифицированные методики Дембо – Рубинштейн и Ф. Норре. Основную группу составили 160 лиц, совершивших суицидальную попытку, из них 98 женщин и 62 мужчины, средний возраст $(41,0 \pm 9,7)$ года, в том числе 86 – с депрессивными расстройствами, 46 – с невротическими нарушениями и 28 психически здоровых. В контрольной группе было 80 здоровых, не совершавших суицидальных попыток, с идентичными гендерным соотношением, средним возрастом и социальным положением. Модификация методик заключалась в том, чтобы результаты были представлены в количественном выражении в баллах. В основной группе показатели диссоциации между высоким уровнем притязаний и низким уровнем самооценки по методикам Дембо – Рубинштейн и Ф. Норре были $46,8 \pm 4,6$, а в контрольной – $27,00 \pm 5,24$ ($P < 0,001$). Отличие между диссоциациями в основной и контрольной группах очень значительное ($P < 0,0005$), показатели 40–45 баллов свидетельствуют о суицидальном риске, а 50–55 уверенно указывают на предстоящую попытку самоубийства. В итоге гипотеза подтверждена и возникает валидный метод предсказания суицида или оценки степени его риска. Способ пригоден для практического использования.

Ключевые слова: самоубийство; риск суицида; психодиагностика.

Введение. Определение групп риска и профилактика суицида остаются актуальной проблемой. Однако результаты исследований, посвящённых поиску предикторов суицидального поведения (психопатологических, личностных, социально-демографических, соматических), не позволили разработать действенных критериев предсказания самоубийств (predictive validity), считая это пока невозможным [6, 9, 11]. ВОЗ указывает на 800 причин самоубийств, среди них 41 % – неизвестны, 19 % – страх наказания, 18 % – психическая болезнь, 16 % – домашние трагедии, 1,2 % – физические болезни и др. В частности, наиболее важные клинко-психопатологические критерии имеют достоверную корреляцию лишь со степенью серьёзности суицидального намерения, что свидетельствует об опосредованном значении психопатологических признаков. Результаты таких исследований в области предсказания суицидального поведения указывают на необходимость других методических подходов [1, 8, 10]. Есть основания предполагать, что более валидные показатели может иметь психодиагностическая методология.

Обоснование гипотезы. Трудности прогноза связывают со многими индивидуальными факторами суицидального риска, непостоянством, изменчивостью пре-

диспонирующих переменных и их сочетаний. Традиционный подход содержит не просто набор социодемографических критериев, но, по сути, аналогию с прогнозированием динамики психопатологических состояний, имеющих свои патокинетические стереотипы. А совершение суицида не предсказуемо подобно динамике психопатологических явлений, поскольку является поведенческой реакцией, и, как любой другой поведенческий акт, не может включать вполне надёжный клинический даже самый обширный комплекс критериев предсказания.

Как следствие – *первое* наиболее общее *положение*: суицидальное поведение правомерно рассматривать не только как патологию с точки зрения рациональности поведения индивида. Развитие мышления в процессе эволюции биологического вида человека разумного связано с появлением нового поведенческого акта – действий по самоуничтожению, не встречающихся в предшествующей лестнице видов. Животные не совершают самоубийств, они способны к самозащите тела, но не собственной личности. Эволюционное совершенствование всякой функции имеет пределы, устанавливаемые потому, что из-за какой-то чрезмерности она становится невыгодной для выживания вида. Это касается, согласно эволюционной теории, иных условий отбора в природе, тем не менее не совсем бесспорно представление о том, что усложнение поведения человека без границ должно быть безусловно выгодным, напротив, имеется фактор, ограничивающий усложнение мышления и поведения.

Второе положение. Суицидальные тенденции имеют определённое сходство с патологией влечений, однако косвенное. Например, вероятность повторного суицида многократно увеличивается. Далее при тяжёлой депрессии может отсутствовать логическая обоснованность (личностный смысл) и предварительное планирование суицидального акта. По другому происходит осознание конца жизни у детей 6–8-летнего возраста, т. е. в начале второго, эгоцентрического, и задолго до третьего, социального, этапа развития самосознания. Поэтому недостаточно оснований выявлять главные критерии предсказания суицида среди социально-демографических. Однако вряд ли следует употреблять и понятие влечение к смерти. Это вновь приведёт к мысли о том, что данное глубинное влечение выявляется опять аналогично генезу психопатологических симптомов по принципам этио-эпигенетической теории Джексона – Эя-Биликевича. Термин «влечение к смерти» сам по себе является оксюмороном – влечение к прекращению влечений, и за счёт своей парадоксальности имеет запоминающееся звучание.

Третье положение. Суицид следует понимать как приспособительную реакцию: сложившиеся обстоятельства несовместимы или же представляются токовыми (в частности, при депрессии) с сохранением собственной личности. Если эти обстоятельства устранить невозможно, то, защищая свою личность, прекратить их действие приходится даже самыми крайними средствами – уничтожением личности. Э. Шнейдман из Лос-Анджелесского центра исследований пишет следующее: «Общей целью для всякого суицида является поиск решения» [4]. Конкретнее это было сформулировано еще психиатром Й. Фридрейхом: суицид является патологической, неэффективной, но именно приспособительной, защитной реакцией, актом самосохранения личности [7]. То же, но иными словами высказал социолог Э. Дюркгейм: «Самоубийства порождаются той утончённой человеческой этикой, которая ставит человеческую личность превыше самого существования» [5].

Цель исследования – экспериментальное подтверждение теоретической посылки – диссоциация между самооценкой и уровнем притязаний является базовым механизмом суицидального поведения. Разработка прикладного метода предсказания суицида.

Материалы и методы. Обследовано 240 лиц за период с 1997 по 2018 г.; I (основная) группа состояла из 160, II (контрольная) – из 80. В основную группу включены лица, совершившие суицидальную попытку, 98 женщин и 62 мужчины,

средний возраст – $(41,0 \pm 9,7)$ года, в том числе 28 психически здоровых, 76 с депрессивными расстройствами и 46 с нарушениями невротического состояния. Диагноз устанавливал консилиум в составе не менее одного профессора, доктора медицинских наук и двух доцентов, кандидатов наук Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца и Киевского медицинского университета, 55 обследовано амбулаторно и 105 – во время госпитализации в базовые клиники указанных вузов. Контрольная группа составлена по принципу «один к одному», т. е. подбору равноценно возрасту, полу, соматическому состоянию, образованию и социальному положению. Примечательно, что 2 человека были исключены из этой группы, поскольку у них обнаружены суицидоопасные показатели, после чего они сознались в совершении попыток самоубийства в прошлом.

Анализ суицидальных рисков проводили методом клинической беседы и психодиагностическим – методики Дембо – Рубинштейна и Ф. Норре, вариант Б. Бержанишвили [2].

Результаты и их обсуждение. В клиническом плане учитывали, что высказанные во введении положения парадоксальны не более чем представление об адаптационном смысле любого соматического синдрома. Тем не менее, противоречие содержится – стремление к самосохранению путём самоуничтожения, и оно должно быть выражено соответствующими клиническими признаками, т. е. анти-суицидные признаки в процессе суицидальных действий могут отражать степень серьёзности и риска повторения попытки.

Под антисуицидными признаками подразумевается наличие у больных осознаваемого противодействия суициду в период приготовления или совершения попытки. Так, у одной категории из 56 больных не обнаружено мыслей о сопротивлении своему суицидальному плану или отмечается вытеснение совершённых поступков такой направленности. Например, больной с меланхолическим синдромом в своём самоотчёте указывает, что «думалось только о бессмысленности жизни». Или, например, больная, демонстративно нанеся себе поверхностное повреждение кожи, настаивает, что ее спасла лишь случайность, она имела решительное намерение погибнуть.

У другой категории из 104 больных отмечается осознанное противодействие выполнявшемуся суицидному замыслу. Например, пациентка с истинной попыткой объясняет, что она думала: «потом пусть уже что угодно врачи сделают, только бы легче стало» (т. е. альтернативный вариант событий). Или в самоотчёте больных высказана боязнь выполнения суицидальных действий (т. е. одновременно и желание, и страх смерти). При демонстративных попытках, в отличие от пациентов первой категории, имеется той или иной степени признание мотивов шантажа: «это была скорее фантазия, я воображала и грозила, точно зная, что до конца не сделаю» или: «была готова на всё и хотелось это всем доказать» (т. е. частичное осознание демонстративности суицидальных действий).

При анализе характерна независимость переменной – не обнаружено связи антисуицидных тенденций со структурой и тяжестью психопатологических синдромов, с видами суицида – демонстративным, аффективным, истинным, как и с вариантами личностного смысла – протестом, призывом, избеганием и др.

Таким образом, при антисуицидных мыслях или осознанных действиях, сопутствующих суицидальному поведению, риск повторной и, есть основания полагать, завершённой попытки оказывается ниже вне подчинённости другим психопатологическим, психологическим, социальным показателям. Неожиданно пациентка с психопатической, очевидно, демонстративной попыткой, но без упомянутых антисуицидных элементов может иметь более высокий риск совершения самоубийства, чем больная с тяжёлой депрессией, но с контрастными мыслями о возможной боли и мучениях при реализации попытки.

Антисуицидные признаки можно учитывать при клиническом осмотре как информативные в отношении прогноза повторного суицида. По данным статистики, процент стационарных больных, которые поступали с повторной суицидальной попыткой, составил среди первой категории 85 и среди второй – 6 [3].

Для психодиагностического метода характерна достаточная для данных задач валидность тестового исследования. Метод основан на представлении, согласно которому суицид возникает при переживании пациентом своей неспособности изменить обстоятельства, несовместимые с сохранением личности, т. е. за всем многообразием суицидальных мотивов, смыслов всегда стоит общий результирующий элемент. В прикладном психодиагностическом подходе отражением ключевого механизма суицида является, с одной стороны, диссоциация между относительно высоким уровнем притязаний (который при депрессиях остается или сохраненным, или чаще повышенным) и, с другой, – низким уровнем самооценки.

Использованы известные психодиагностические методики, дополненные количественной оценкой результатов. Моторная проба Шварцландера оказалась технически неудобной, поэтому применяли методику оценки уровня притязаний Ф. Норре (Бежанишвили). Как и в оригинальной методике, перед испытуемым раскладывают вертикально два столбика по 12 пронумерованных карточек, на обороте которых написаны задания (например, назвать 5 государств на букву «П» и т. д.) нарастающей сложности от 1-го к 12-му номеру. Модификация не меняет сути методики. Несколько устаревших вопросов изменены (вместо «известных советских киноартистов на букву ...» стало «известных Вам киноартистов ...» и т. п.). Далее испытуемый получает следующее задание: за ограниченное время (!) 5 мин перевертывать карточки и устно решать задания, чтобы набрать максимальное количество баллов, за успешные ответы – сумма решённых номеров. При этом нет никаких ограничений в порядке выбора первой и последующих карточек, можно отказываться от попыток решения для экономии времени, необходим только достигнутый результат. Оценка уровня притязаний психологом состоит из общей суммы: номер карточки, с которой испытуемый начинает выполнять задание, – «притязать» на результат; плюс 5 баллов за каждую неадекватную реакцию на неуспешный ответ по типу повышенного уровня притязаний (т. е., если после нерешённого задания, он выбирает сложнее); или минус 5 баллов за реакцию на успешный ответ по типу сниженного уровня – если после решённого задания испытуемый выбирает более простое. Показатели значительно различаются: у суицидентов – 20–26 баллов, в контрольной группе – 6–18 баллов, несмотря на психомоторное торможение у некоторых пациентов с депрессией. Результаты в основной группе – $22,8 \pm 3,2$, в контрольной – $10,7 \pm 4,6$ ($P < 0,001$).

Вторая методика исследования уровня самооценки включает вербальный вариант самооценочного теста Дембо – Рубинштейн. Следует напомнить, что методика состоит из четырёх шкал, по которым испытуемый ставит оценку своему здоровью, умственным способностям, характеру и уровню счастья. Нумерация в каждом из четырёх столбиков утверждений, по 9 пунктам, происходит от наивысшей до наинизшей оценки своих качеств.

Модификация данной методики формальная. Во-первых, вербальный вариант позволяет суммировать количество баллов (выбранных номеров ответа), что и является показателем уровня самооценки. Во-вторых, испытуемый отвечает полуанонимно, т. е. не называет выбранных пунктов, а сообщает психологу/врачу только сумму набранных баллов. Это принципиально важно (!) для обеспечения откровенности выбора. Получаем обычно 22–28 баллов при депрессии и 12–18 – при нормотимии. Показатели в основной группе – $24,0 \pm 3,2$, в контрольной – $14,8 \pm 3,4$ ($P < 0,001$).

Различие данных по обеим методикам характеризует степень диссоциации при наличии таковой, между высоким уровнем притязаний и низким уровнем

самооценки, т. е. суммируется показатель уровня притязаний и показатель самооценки (чем больше баллов, тем она ниже). Показатели в основной группе – $46,8 \pm 4,6$, в контрольной – $27,00 \pm 5,24$ ($P < 0,001$). Различия были явными в индивидуальных наблюдениях и достоверны уже в малых выборках. Возможно, речь идёт даже о наивысшей валидности этого критерия среди других способов оценки суицидального риска. О наличии последнего свидетельствует диссоциация более 40–45 баллов, а 50–55 баллов и выше позволяют на практике уверенно ожидать предстоящую суицидальную попытку (независимо какая личность – возбудимая или сензитивная, больной с гипотимией или параноидом, благополучного социального положения или нет и т. п.), т. е. экспериментально отражено наличие базового элемента суицидального поведения. Не только абсолютный показатель, но в динамике быстрое повышение рассогласования притязаний и самооценки (формулы П. Стивенсена «я непременно должен, но неспособен») можно назвать предвестником суицида.

Несмотря на узкий частный вопрос суицидологии, сразу замечен индекс цитирования англоязычных тезисов в Research Gate и появился полный текст устного доклада в русском учебнике. Практики приняли методику как безальтернативную. Если возникает интерес, то авторы обязательно должны указать на недостатки. Мы имеем не окончательно доработанный метод. Простота видимая, для подобной психодиагностики необходимы высококвалифицированный психолог, организация обстановки, установление контакта с испытуемым. Поэтому тестовые методики по самооценке и уровню притязаний следовало бы обновить/заменить. Валидность приемлемая, но имеются претензии к точности и надёжности, что, впрочем, относится к компетенции специалистов в этой области. Кроме того, выявить высокий показатель, предсказывающий суицидальную попытку, недостаточно. Желательно использовать более низкие показатели не ориентировочно, а сопоставить со степенью суицидального риска, что опять предполагает огромную исследовательскую работу. Однако имеющийся начальный вариант уже пригоден для практики клинического психолога и врача.

Выводы. 1. Наличие клинических антисуицидальных компонентов свидетельствует о более низком риске повторного и завершённого суицида. 2. Психодиагностические показатели диссоциации между низкой самооценкой и высоким уровнем притязаний являются валидными для предсказания суицида.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

1. Аванесов С. С. Вольная смерть. Ч. 1. Основания философской суицидологии. – Томск: Том. гос. ун-тет, 2003. – 396 с.
2. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб: Питер, 2006. – 351 с.
3. Дзюб Г. К., Кузнецов В. М., Нестерчук Н. В. Ургентна психіатрія. – К.: ТОВ Офсет, 2010. – 191 с.
4. Шнейдман Э. Душа самоубийцы. – М.: Смысл, 2001. – 316 с.
5. Durkheim E. Le Suicide: Etude de sociologie. – Paris: Presses universitaires de France, 1960. – 463 p.
6. Franklin J. Suicide Prediction Remains Difficult Despite Decades of Research. – 2018. – <https://www.scientificamerican.com/article/suicide-prediction-remains-difficult-despite-deca>
7. Friedreich J. B. Systematische Literatur der ärztlichen und gerichtlichen Psychologie. – Berlin: Enslin, 1833. – 216 p.
8. Glenn C. R., Nock M. K. Improving the Short-Term Prediction of Suicidal Behavior // Am. J. Prev. Med. – 2014. – Vol. 47, N 3 (Suppl 2). – S. 176–180.
9. Goldstein R. B., Black D. W., Nasrallah A. et al. The Prediction of Suicide Sensitivity, Specificity, and Predictive Value of a Multivariate Model Applied to Suicide Among 1906 Patients With Affective Disorder // Arch. Gen. Psychiatry. – 1991. – Vol. 48, N 5. – P. 418–422.
1. Avanesov S. S. Vol'naya smert'. Ch. 1. Osnovaniya filosofskoj suicidologii. – Tomsk: Tom. gos. un-tet, 2003. – 396 p.
2. Burlachuk L. F. Psihodiagnostika. – SPb: Piter, 2006. – 351 p.
3. Dzyub G. K., Kuznecov V. M., Nesterchuk N. V. Urgentna psihiatriya. – K.: TOV Ofset, 2010. – 191 p.
4. Shnejdman E. Dusha samoubijcy. – M.: Smysl, 2001. – 316 p.

10. Harris K. M., Syu J. J., Lello O. D. et al. The ABC's of Suicide Risk Assessment: Applying a Tripartite Approach to Individual Evaluations. – Published: June 1. – 2015. – <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127442>
11. Pokorny A. D. Prediction of suicide in psychiatric patients. Report of a prospective study // Arch. Gen. Psychiatry. – 1983. – Vol. 40, N 3. – P. 249–257.

ПСИХОДІАГНОСТИКА СУЇЦИДУ

Г. К. Дзюб, В. А. Процик (Київ)

Запропоновано оригінальну гіпотезу виявлення готовності до самогубства: дисоціація між низькою самооцінкою і високим рівнем домагань має місце при всіх видах суїциду. Головним положенням є те, що суїцид відбувається в ситуації, коли навколишні умови є або уявляються повністю несумісними з самооцінкою людини, збереженням особистості, тоді захисна пристосувальна реакція особистості відбувається найрадикальнішим способом – самознищенням. Тому для виявлення готовності до самогубства можна використати методи експериментально-психологічного (психодіагностичного) дослідження. Це методи самооцінки ситуації, тобто тест оцінки власних достоїнств, а також визначення рівня домагань в поведінці. Розбіжність показників цих тестів буде відображати ступінь готовності до суїциду. Шляхом клінічного й експериментально-психологічного дослідження отримано підтвердження. На матеріалі 240 осіб використовували модифіковані методи Дембо – Рубінштейн та Норре. Основну групу становили 160 осіб, які здійснили суїцидальну спробу, з них 98 жінок і 62 чоловіки, середній вік – $(41,0 \pm 9,7)$ року, в тому числі 86 – з депресивними розладами, 46 – з невротичними порушеннями і 28 психічно здорових. У контрольній групі було 80 здорових, що не здійснювали суїцидальних спроб, з ідентичним гендерним співвідношенням, середнім віком і соціальним становищем. Модифікація методик полягала в тому, щоб результати були представлені в кількісному вираженні в балах. В основній групі показники дисоціації між високим рівнем домагань і низьким рівнем самооцінки за методиками Дембо – Рубінштейн та Норре були $46,8 \pm 4,6$, а в контрольній – $27,00 \pm 5,24$ ($P < 0,001$). Відмінність між дисоціаціями в основній і контрольній групах дуже значна ($P < 0,0005$), показник 40–45 балів свідчить про суїцидальний ризик, а 50–55 впевнено вказують на очікувану спробу самогубства. В результаті гіпотезу підтверджено і виникає валідний метод передбачення суїциду або оцінки ступеня його ризику, спосіб придатний для практичного використання.

Ключові слова: самогубство; ризик суїциду; психодіагностика.

PSYCHODIAGNOSTICS OF SUICIDE

G. K. Dzuby¹, V. A. Protzyc² (Kiev, Ukraine)

¹Kiev Taras Shevchenko National University; ²Bogomolets National Medical University

An original hypothesis for the detection of suicidal readiness has been proposed: the dissociation between low self-esteem of personal qualities and high level of claims in behavior exists in all types of suicides. The main point is that suicide occurs in a situation where environmental conditions are appear to be completely incompatible with a person's self-esteem; preserving the personality then the protective adaptive response of the personality is accomplished in the most radical way – self-destruction. Therefore, to detect readiness for suicide, you can use the methods of experimental psychological (psychodiagnostic) research. These are methods of self-assessment of a situation, that is, a tests assessing one's own merits and determining the level of claims in behavior. Discrepancies in the performance of these tests will reflect the degree of readiness for suicide. Confirmation has been obtained through clinical and experimental psychological research. On the material of 240 subjects, the modified methods of Dembo – Rubinstein and Hoppe were used. The main group consisted of 160 persons who committed suicidal attempts, of which 98 women and 62 men, average age (41.0 ± 9.7) years, including 86 with depressive disorders, 46 with neurotic disorders and 28 mentally healthy. In the control group there were 80 healthy individuals who did not commit suicidal attempts, with identical gender balance, average age and social status. The modification of the methods was that the results were presented in quantitative terms in points. In the main group, the dissociation indicators between the high level of claims and low self-esteem according to the methods of Dembo – Rubinstein and Hoppe were 46.8 ± 4.6 , and in the control group – 27.00 ± 5.24 ($P < 0,001$). The difference between dissociation in the main and control groups is very significant ($P < 0,0005$), a score of 40–45 points indicates a suicidal risk, and 50–55 and more confidently point to the upcoming suicide attempt. As a result, the hypothesis is confirmed and a valid method of predicting suicide or assessing the degree of its risk arises; the method is suitable for practical use.

Key words: suicide; risk of suicide; psychodiagnostics.